A2C2

Adaptation of Agriculture
to Climate Change
University of Talca

Plant
Breeding
and
Phenomic
Center

Adaptación de cultivos a un ambiente cambiante

Alejandro del Pozo

Agosto 2017. Talca-CHILE.

Región Mediterránea de Chile

PP in La Serena

PP in Concepción

Mapas de cambio porcentual de precipitación para los períodos 2011-2030 y 2031-2050, sobre la base histórica de 1961-1990, para cuatro escenarios de cambio climático

A: RCP2.6 (2011-2030)

B: RCP8.5 (2011-2030)

C: RCP2.6 (2031-2050)

D: RCP8.5 (2031-2050)

Se proyectan disminuciones de precipitación entre 5 y 15%, para las latitudes 27°S a 45°S

Figura 5. Series de tiempo de anomalías de temperatura en Chile central

Fuente: Falvey y Garreaud, 2009

¿Qué efectos tiene el déficit hídrico en los procesos fisiológicos y metabólicos de las plantas?

- Reducción del potencial hídrico
- Cierre de estomas
- Disminución de la tasa de transpiración y de la fotosíntesis

- Estrés oxidativo asociado al estrés hídrico
- Inhibición de la división y expansión de células
- Aumento de metabolitos en hojas

Efectos del déficit hídrico en el crecimiento y producción de cultivos

- Reducción del área foliar
- Aumento en la temperatura de la hoja
- Reducción del crecimiento y de la biomasa acumulada
- Reducción de la radiación interceptada por el cultivo (y de RUE)
- Aumento en la relación de biomasa de raíces: biomasa aérea
- Reducción del rendimiento y calidad de granos o frutos

Nuestros objetivo

Estudiar la adaptación de cultivos a condiciones adversas y seleccionar líneas/cultivares mas tolerantes a estreses ambientales

Caracteres asociados al rendimiento en sequía

Fotoprotección

- **Morfología de la hoja:**
 - ceras/pubescencia
 - postura/enrollamiento
- **Pigmentos**
 - Clorofila a:b
 - Carotenoides
- **Antioxidantes**

Eficiencia de transpiración

- **Uso eficiente del agua**
 - alta discriminación $^{12/13}\text{C}$
- **Fotosíntesis de espigas**
- **Senescencia retardada (“stay-green”)**

Partición de la biomasa

- **Acumulación de carbohidratos en el tallo antes de antesis**
- **Índice de cosecha**

Absorción de agua

- **Distribución y profundidad de raíces**
- **Doseles mas frías**
- **Ajuste osmótico**

Fenotipado de cultivos

- El **fenotipado de plantas** consiste en la aplicación de metodologías y protocolos que permitan medir un rasgo específico relacionado con la estructura o función de la planta, y que van desde el nivel celular hasta la planta completa y el cultivo.
- El fenotipado de plantas mediante **rasgos fisiológicos**, como complemento a los rasgos agronómicos, puede ayudar a identificar las características seleccionables que aceleran la mejora para el potencial de rendimiento y bajo sequía.

Fenotipado de 140 líneas recombinantes de cebada (RCSLs)

Recombinant Chromosomes Substitutions Lines- RCSLs

El rendimiento (GY) de las líneas recombinantes de cebada (RCSLs) se relaciona con el índice de cosecha

Relación entre la conductancia estomática (g_s) y la discriminación isotópica del carbono ($\Delta^{13}C$) y el rendimiento relativo de grano en 25 RCSLs de cebada (2004 y 2007)

➤ Alto $\Delta^{13}C$

➤ Bajo $\Delta^{13}C$

del Pozo, A., Castillo, D., Inostroza, L., Matus, I., Méndez, A.M., Morcuende, R. 2012. *Annals of Applied Biology* 160(2): 157–167.

Fenotipado de alto rendimiento de 384 genotipos de trigo de primavera con y sin estrés hídrico

- Cauquenes (≈600 mm)

- Santa Rosa (con riego)

Estrés hídrico

del Pozo, A. et al. (2016). *Frontiers in Plant Science* doi: 10.3389/fpls.2016.00987

Seleccionamos líneas de alto rendimiento tanto en ambientes de secano como de riego

Las líneas avanzadas de trigo más productivas tienen **mayor índice de cosecha**, tanto en condiciones de secano como en riego

Las reservas del tallo

- En los cereales, la acumulación de carbohidratos solubles en agua (WSC) en el tallo permite la remobilización de éstos durante el período de llenado del grano: 5-20% de la materia seca del grano en plantas sin estrés hídrico.
- Bajo estrés hídrico, donde la fotosíntesis está deprimida, el llenado del grano depende más de la movilización de reservas en el tallo, y puede representar entre 22 y 60% de la materia seca acumulada en el grano.

Distribución de frecuencia para la concentración de WSC en tallos de 384 genotipos de trigo de primavera en dos condiciones climáticas mediterráneas

Relación entre el contenido de WSC de tallos y el rendimiento de grano y sus componentes

	Contenido de WSC en el tallo				
	WS 2011	WS 2012	MWS 2011	FI 2011	FI 2012
Rendimiento	-0.07	0.15	-0.09	-0.33	0.05
N° espigas/m ²	-0.41	-0.30	-0.44	-0.45	-0.53
N° granos/espiga	0.22	0.28	0.21	0.19	0.27
Peso de 1000 granos	0.38	0.31	0.40	0.30	0.50

Genotype	Origin	YTI ¹
FONTAGRO 8	INIA-Chile	0.60
Pantera	INIA-Chile	0.49
Don Alberto	INIA-Uruguay	0.47
LE2384	INIA-Uruguay	0.43
QUP2522	INIA-Chile	0.35
Fontagro 69	INIA-Chile	0.23
CCCI09	INIA-Uruguay	0.20
Fontagro 98	CIMMYT-Mexico	0.18

$$YTI = \left(\frac{Y_D}{\bar{Y}_D} \right) \left(\frac{Y_I}{\bar{Y}_I} \right) \left(\frac{\bar{Y}_D}{\bar{Y}_I} \right) = \left(\frac{Y_D Y_I}{\bar{Y}_I^2} \right)$$

Rendimiento de granos y discriminación del carbon (Δ¹³C)

Estrés hídrico ←

➤ Bajo

➤ Alto Δ¹³C

Rendimiento de granos y temperatura del dosel

En resumen, los genotipos con mayor rendimiento bajo condiciones de estrés hídrico presentan:

Fotoprotección

- Morfología de la hoja:
 - ceras/pubescencia
 - postura/enrollamiento
- Pigmentos
 - Clorofila a:b
 - Carotenoides
- Antioxidantes

Eficiencia de transpiración

- **Uso eficiente del agua**
 - alta discriminación $^{12}/^{13}C$
- Fotosíntesis de espigas
- Senescencia retardada (“stay-green”)

Partición de la biomasa

- **Acumulación de carbohidratos en el tallo antes de antesis**
- **Índice de cosecha**

Absorción de agua

- Distribución y profundidad de raíces
- **Doseles más frías**
- Ajuste osmótico

Estudio de la características de las raíces en trigo

Dr. Nidia Brunel (Postdoc)

Dr. Fernando Guerra

- Características morfológicas y fisiológicas de las raíces**
- Uso eficiente del agua**
- Estudios de expresión de genes de acuaporinas en hojas y raíz**

Genotipos Susceptibles

Biomasa

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1

Genotipos control

Biomasa

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Genotipos Tolerantes

Biomasa

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

— QUP 2569
— LE 2367
— F6CL09
— FONT 98

— PANDORA
— PANTERA

— FONT 8
— QUP 2529
— FONT 92
— QUP 2546
— LE2384

16 genotipos de trigo con diferente tolerancia al estrés hídrico

Comparación de 4 especies de cereales: trigo harinero, trigo candela, cebada y triticale

¿Cómo es la relación entre los rasgos fisiológicos complejos y el rendimiento de grano y sus componentes agronómicos?

¿Cómo es la heredabilidad y la interacción GxE de estos rasgos fisiológicos?

¿Pueden predecirse estos complejos rasgos mediante tecnologías de teledetección?

Quinoa: variabilidad genotípica y tolerancia al estrés hídrico

Kurt Ruf (PhD thesis)
Prof. Alejandro del Pozo
Dr. Christian Alfaro (INIA)
Dr. Andrés Zurita (INIA)

- ❑ Determinación de la variabilidad fenotípica de los caracteres agronómicos y morfofisiológicos en 96 genotipos de quinoa bajo condiciones de secano y riego
- ❑ Determinación de la variabilidad genotípica a través de marcadores moleculares e identificar SNP asociados QTLs

Alfalfa: ecofisiología, tolerancia a la sequía estival y selección de genotipos elite

Dr. Carlos Ovalle (INIA)
Prof. Alejandro del Pozo
Dr. Luis Inostroza (INIA)
Dra. Macarena Gerding (Udec)
Dra. Soledad Espinoza (INIA)
Alan Humphries (SARDI, Australia)

del Pozo, A., Ovalle, C., Espinoza, S., Barahona, V., Gerding, M., Humphries, A. 2017. Water relations, persistence and productivity of nine alfalfa cultivars growing in field conditions in Mediterranean environments of central Chile. *European Journal of Agronomy* 84: 16-22.

- Fenotipado para tolerancia a la sequía y fijación de nitrógeno de 70 accesiones de alfalfa (50 de Kazajstán y Azerbaiyán) y centros secundarios (20 de los Andes septentrionales y Chile) de origen.
- Identificación de genotipos de élite de cada población y caracterización fenotípica y genotípica utilizando marcadores de SNPs.
- Estudios de asociación genómica (GWAS) utilizando los datos genotípicos y fenotípicos.

Arándanos: ecofisiología y fenómica de arbusto alto (*Vaccinium corymbosum*)

Dr. Gustavo Lobos

Dra.(c) Claudia Moggia

Dr. James Hancock (MSU, USA)

Dr. Randy Beaudry (MSU, USA)

Carolina Bravo, MSc.

Marcelo Valdés (asistente)

- Fenómica como herramienta para acelerar el mejoramiento genéticos de arándanos bajo condiciones adversas (hídrico y térmico).
- Estudio de la variabilidad la firmeza a cosecha y post-cosecha mediante la caracterización de la fruta durante la temporada y el control exógeno por medio de reguladores del crecimiento.
- Determinación de los factores de pre-cosecha y cosecha que afectan la evolución de la calidad de la fruta en almacenaje.

<http://www.fenomica.otalca.cl/>

Centro de
Mejoramiento
Genético y
Fisiología Vegetal

Agradecimientos

Plant
Breeding
and
Phenomic
Center

Universidad de Talca

- ❑ Prof, Alejandro del Pozo
- ❑ Dr, Gustavo Lobos
- ❑ Dr, Freddy Mora
- ❑ Dr, Fernando Guerra
- ❑ Dra, Nidia Brunel (postdoc)
- ❑ Dra, Ana María Mendez (postdoc)
- ❑ Dr, Miguel Garriga (postdoc)
- ❑ Dra. Alejandra Yáñez
- ❑ Yerko Quitral (PhD thesis)
- ❑ Sebastián Romero (PhD thesis)
- ❑ Felipe Moraga (PhD thesis)
- ❑ Félix Estrada (PhD thesis)
- ❑ Kurt Ruf (PhD thesis)
- ❑ Alejandro Escobar, MSc (asistente)

INIA

- ❑ Dr, Iván Matus
- ❑ Dr, Gerardo Tapia
- ❑ Dra, Dalma Castillo
- ❑ Dr. Cristian Aljaro
- ❑ Dr. Andrés Zurita
- ❑ Alejandro Castro (Técnico)
- ❑ Millaray Ponce (Técnico)

University of Laval

- ❑ Dr, François Belzile

Kansas State University

- ❑ Dr, Jesse Poland

GRANTS--

- FONDECYT 1150353, (2015-2017)
- -FONDECYT POSTDOC (Nidia Brunel), (2014-2017)
- Ministerio de Economía y Competitividad de España AGL2013-44147-R, (2014-2017)
- -FONDEF Idea 14110106, (2015-2017)
- -FONDEQUIP NACIONAL EQM130073, (2013-2015),
- FONDECYT N°1110732, (2011-2014)
- -FONTAGRO ATN/OC – 11943, (2010-2013)
- Atracción de Capital Humano Avanzado del Extranjero A Chile (CONICYT), (2011-2012)
- CGIAR-GCP Challenge (2008-2010)
- FONDECYT N° 1060546 (2006-2008),

INIA Uruguay

- ❑ Dr, Jari von Zitzewitz
- ❑ Dr, Martin Quinque
- ❑ Dra, Marina Castro
- ❑ Mrs, Bettina Lado (MSc)

Universidad de Barcelona

- ❑ Prof, José Luis Araus
- ❑ Dr. Iker Aranjuelo

A2C2

Adaptation of Agriculture
to Climate Change

University of Talca

Plant
Breeding
and
Phenomic
Center

GRACIAS
por su atención